

ワクチン	種類	接種方法	区分	回数	対象者（公費接種）	間隔	標準的な接種時期
ロタウイルス	生	経口	ロタリックス	2回	生後6週～24週	少なくとも4週間の間隔をあけて2回接種 初回接種は生後14週6日まで （推奨）	生後2か月、3か月で接種
			ロタテック	3回	生後6週～32週	少なくとも4週間の間隔をあけて3回接種 初回接種は生後14週6日まで （推奨）	生後2か月、3か月、4か月で接種
B型肝炎	不活化	注射	—	3回	1歳未満	中27日以上の間隔で2回接種後、 1回目から 139日以上の間隔（ 20週後～ ）をあけて3回目を接種	生後2か月～9か月
ヒブ	不活化	注射	初回	3回	生後2か月～60か月（5歳）に至るまで	中27日以上	生後2か月、3か月、4か月で接種
	不活化	注射	追加	1回		初回の3回終了後 7か月以上 の間隔をあけて追加接種	生後12か月～15か月
肺炎球菌	不活化	注射	初回	3回	生後2か月～60か月（5歳）に至るまで	中27日以上	生後2か月、3か月、4か月で接種
	不活化	注射	追加	1回		生後12か月以降 かつ初回の3回終了後 60日以上 の間隔をあけて追加接種	生後12か月～15か月
四種混合 (DPT-IPV) ^{注1)}	不活化	注射	初回	3回	生後3か月～90か月（7歳半）	中20日以上	生後3か月、4か月、5か月で接種
	不活化	注射	追加	1回		初回の3回終了後 6か月以上 の間隔をあけて追加接種	生後12か月～18か月
BCG	生	注射	—	1回	生後3か月～1歳に至るまで	—	生後5か月～8か月
MR	生	注射	1期	1回	生後12か月から生後24か月に至るまで	—	1歳になったらすぐ
	生	注射	2期	1回	小学校就学前の1年間	—	年長クラスのあいだ
水痘	生	注射	—	2回	生後12か月から生後36か月に至るまで	3か月以上 の間隔で2回接種	1回目：生後12か月から15か月 2回目：1回目接種後、6か月～12か月
日本脳炎	不活化	注射	1期初回	2回	生後6か月～生後90か月(7歳半)に至るまで	中6日以上	3歳～4歳
	不活化	注射	1期追加	1回		1期初回の2回終了後 6か月以上 の間隔をあけて追加接種	初回の2回終了後おおむね1年後
	不活化	注射	2期	1回	9歳以上13歳未満	—	9歳～10歳
日本脳炎 (特例措置)	不活化	注射	特例措置①	全4回の不足分	平成19年4月1日以前生まれで20歳未満	高槻市のホームページを参照 ^{注2)}	—
			特例措置②	1期3回の不足分	平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで、9歳以上13歳未満の者	高槻市のホームページを参照 ^{注2)}	—
二種混合 (DT) ^{注3)}	不活化	注射	—	1回	11歳以上13歳未満	—	11歳～12歳

注1) 四種混合ワクチン（DPT-IPV）の対象疾患：ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ

注2) 日本脳炎の特例措置について：高槻市のホームページを参照

http://www.city.takatsuki.osaka.ip/kakuka/kodomo/khoken/gyomuunnai/vaccination/news/nihon_noen.html

注3) 二種混合ワクチン（DT）の対象疾患：ジフテリア、破傷風