

ワクチン	種類	接種方法	区分	回数	対象者（公費接種）	間隔	標準的な接種時期
ロタウイルス	生	経口	ロタリックス	2回	生後6週～24週	少なくとも4週間の間隔をあけて2回接種 <b>初回接種は生後14週6日まで</b> （推奨）	生後2か月、3か月で接種
			ロタテック	3回	生後6週～32週	少なくとも4週間の間隔をあけて3回接種 <b>初回接種は生後14週6日まで</b> （推奨）	生後2か月、3か月、4か月で接種
B型肝炎	不活化	注射	—	3回	1歳未満	中27日以上の間隔で2回接種後、 <b>1回目から</b> 139日以上の間隔（ <b>20週後～</b> ）をあけて3回目を接種	生後2か月～9か月
ヒブ	不活化	注射	初回	3回	生後2か月～60か月（5歳）に至るまで	中27日以上	生後2か月、3か月、4か月で接種
	不活化	注射	追加	1回		初回の3回終了後 <b>7か月以上</b> の間隔をあけて追加接種	生後12か月～15か月
肺炎球菌	不活化	注射	初回	3回	生後2か月～60か月（5歳）に至るまで	中27日以上	生後2か月、3か月、4か月で接種
	不活化	注射	追加	1回		<b>生後12か月以降</b> かつ初回の3回終了後 <b>60日以上</b> の間隔をあけて追加接種	生後12か月～15か月
四種混合 (DPT-IPV) <sup>注1)</sup>	不活化	注射	初回	3回	生後2か月～90か月（7歳半）	中20日以上	生後3か月、4か月、5か月で接種
	不活化	注射	追加	1回		初回の3回終了後 <b>6か月以上</b> の間隔をあけて追加接種	生後12か月～18か月
BCG	生	注射	—	1回	生後3か月～1歳に至るまで	—	生後5か月～8か月
MR	生	注射	1期	1回	生後12か月から生後24か月に至るまで	—	1歳になったらすぐ
	生	注射	2期	1回	小学校就学前の1年間	—	年長クラスのあいだ
水痘	生	注射	—	2回	生後12か月から生後36か月に至るまで	<b>3か月以上</b> の間隔で2回接種	1回目：生後12か月から15か月 2回目：1回目接種後、6か月～12か月
日本脳炎	不活化	注射	1期初回	2回	生後6か月～生後90か月(7歳半)に至るまで	中6日以上	3歳～4歳
	不活化	注射	1期追加	1回		1期初回の2回終了後 <b>6か月以上</b> の間隔をあけて追加接種	初回の2回終了後おおむね1年後
	不活化	注射	2期	1回	9歳以上13歳未満	—	9歳～10歳
日本脳炎 (特例措置)	不活化	注射	特例措置①	全4回の不足分	平成19年4月1日以前生まれで20歳未満	高槻市のホームページを参照 <sup>注2)</sup>	—
			特例措置②	1期3回の不足分	平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで、9歳以上13歳未満の者	高槻市のホームページを参照 <sup>注2)</sup>	—
二種混合 (DT) <sup>注3)</sup>	不活化	注射	—	1回	11歳以上13歳未満	—	11歳～12歳

ワクチン	種類	接種方法	商品名	回数	対象者	間隔	標準的な接種時期
おたふくかぜ	生	注射	—	2回(推奨)	生後12か月以上	明確な規定はない（1～数年間隔）	1歳と5歳で接種
三種混合(DPT) <sup>注4)</sup>	不活化	注射	—	1～2回	(右欄を参照)	(右欄を参照)	(日本小児科学会の推奨) 1回目：5歳以上7歳未満 2回目：11歳以上13歳未満 * 定期の二種混合の代わりに接種してもよい